

VitaFer[®]

MICRO

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania kluczowych mikrośladników z optymalnym dodatkiem azotu

11,60% N + 14,50% K₂O + 4,35% MgO
+ 7,25% SO₃ + mikroelementy

VitaFer[®] Micro jest wysoko skoncentrowanym nawozem do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania pełnej palety mikrośladników oraz kluczowych makrośladników roślinie. Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

Szczególnie polecany jest dla upraw ozimych (zboża, rzepak), ponieważ przygotowuje je do przejścia w stan spoczynku zimowego oraz podnosi ich odporność na warunki stresowe, takie jak np. mróz. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, co przekłada się na zdrowe plony o wysokiej wartości handlowej.

Nawóz może być stosowany w momencie objawienia się deficytu.

Charakterystyka działania

- Szybko wyrównuje niedobory potasu, magnezu, azotu, siarki oraz kluczowych mikroelementów, a także zapobiega wystąpieniu deficytów tych składników,
- Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi mikro- i kluczowych makroelementów,
- Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
- Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na niekorzystne warunki atmosferyczne,
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Buraki cukrowe	2	0,5 – 1	Faza 4-8 liści (BBCH 14-18) i gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35)
Drzewa owocowe	2-3	0,5 – 1	Początek rozwoju owoców (BBCH 71), dwa tygodnie po pierwszym zabiegu i po zbiorach
Kukurydza	2	0,5 – 1	Faza 4-8 liści (BBCH 14-18) i 2 tyg. po pierwszym zabiegu
Rzepak	3	0,5 – 1	Jeden zabieg jesienią w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18), dwa zabiegi wiosną; po wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 50-59)
Warzywa gruntowe	2-3	0,5 – 1	W okresie intensywnego wzrostu, pierwszy w fazie 3-4 liści (BBCH 13-14) lub 10-14 dni po wysadzeniu, kolejne zabiegi co 7-10 dni
Zboża	3	0,5 – 1	Jeden zabieg jesienią; w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18), 2 zabiegi wiosną; po wznowieniu wegetacji oraz do końca fazy kłoszenia (BBCH 51-59)
Ziemniaki	2	0,5 – 1	W okresie zawiązywania bulw (BBCH 40-49) oraz po kwitnieniu (BBCH 69)

